



बराहपोखरी गाउँपालिका
BARAHAPOKHARI RURAL MUNICIPALITY
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE
बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ
BAGHKHOR BHANJYANG, KHOTANG
कोशी प्रदेश, नेपाल
KOSHI PROVINCE, NEPAL



प.सं.: २०८२/८३

च.नं.:

धानको रोग किरा व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी

१. धानको मरुवा रोग - Blast

लक्षण: पातमा, आँखलामा र अन्य भागमा लाम्चो दाग वा थोप्ला देखिन्छन्। आँखला आक्रमण भएमा सजिलै भाँचिन्छ। यस्तो अवस्थाको रोगीलाई घाँटीमा डढुवा (Neck blast) लागेको भनिन्छ



व्यवस्थापन : अवरोधक जातको धान लगाउने। संतुलित मल प्रयोग गर्ने (N.P.K.), सिफारिस गरेको भन्दा धेरै नाईट्रोजन प्रयोग नगर्ने। नियमित अनुगमन गर्ने आद्रता र मौसममा आउने कमी संगै रोगको प्रकोप घट्छ। रोगनाशक विषादी (ट्राइसाइक्लाजोल १ ग्राम प्रति लिटरको दरले प्रयोग गर्ने १-२ मिली पानी वा कासुगा माइसिन १.२ मि.ली.। अवरोध जातको धान प्रयोग गर्ने सिँचाईको पानी रोग लागेको खेतबाट रोग नभएको ठाउँमा जान नदिने।

२. धानको खैरो थोप्ले रोग (Brown spot)

लक्षण: पात पहेलिनु, पातमा खैरो वा कौंसजस्तो रंग भएको थोप्ला हुनु। जरा खैरो हुनु।



"कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा र पूर्वाधार : सभ्य समृद्ध बराहपोखरी गाउँपालिकाको मूल आधार"



www.barahapokharimun.gov.np ✉ info@barahapokharimun.gov.np ☎ ANB No. 1618070703601





बराहपोखरी गाउँपालिका
BARAHAPOKHARI RURAL MUNICIPALITY
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ
BAGHKHOR BHANJYANG, KHOTANG
कोशी प्रदेश, नेपाल
KOSHI PROVINCE, NEPAL



प.सं.: २०८२।८३

च. नं.:

व्यवस्थापन : रोग अवरोधक जात प्रयोग गर्ने। ५ किलो जिक सल्फेट र २.५ किलो चुन १००० लिटर पानीमा प्रति हेक्टर छर्ने। प्रोपिनेव ७०% डब्लुपी ३ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले प्रयोग गर्ने।

३. सिथ ब्लाइट (Sheath Blight)

लक्षण: लिफ सिथमा दाग हुनु । फेदमा वा लक्षणको ठाउँमा स्क्लेरोसिया (Sclerotia) बन्नु ।



व्यवस्थापन: अवरोधक जात प्रयोग गर्ने । सन्तुलित मलखाद (ना.फ.पो) राख्ने । बीउ उपचार । भेलिडामाइसीन ३९, एल. ३ ग्राम प्रतिलिटर पानी हेक्जाकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी २ मिलि प्रति लिटर पेन्साइकुरन २२.९ एस.सी. १.५ मि.लि. प्रति लिटर पानी ।

४. धानको खैरो फड्के (Rice Brown Plant Hopper)

पहिचान: वयस्क २.५-३.४ मि.मि. लामो खैरो शरीर । साना र ठूला पखेटाहरु हुने दुवै थरिका नगहिरएको निधार। मझौलो पिठ्यू खण्डमा ३ खैरा धर्साहरु पखेटाहरुमा मधुरा नसाहरु राता पहेँला आँखाहरु । शिशु फड्के : खैरो शरीर ।



"कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा र पूर्वाधार : सभ्य समृद्ध बराहपोखरी गाउँपालिकाको मूल आधार"



www.barahapokharimun.gov.np info@barahapokharimun.gov.np ANB No. 1618070703601





वराहपोखरी गाउँपालिका
BARAHAPOKHARI RURAL MUNICIPALITY
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ
BAGHKHOR BHANJYANG, KHOTANG
कोशी प्रदेश, नेपाल
KOSHI PROVINCE, NEPAL



प.सं.: २०८२।८३


च.नं.:

क्षतिको लक्षण: पानीको सतह लगतै माथिको डाँठको भागमा कालो दुसी उमेका । होपर बर्न । रागड स्टण्ट र ग्रासी स्टण्ट बोटहरु ।

रोकथामका उपाय: हरिया फड्केहरु नियन्त्रण गरे झैं । यस कीराको लागि स्प्रे गर्दा बोटहरुको फेद तर्फ उपचार गर्न विर्सन हुन्न । बेर्ना वाक्लो नरोप्ने । जथाभावी विषादि प्रयोग नगर्ने । एसीफेट ७५% एसी पी २ एम एल वा बुप्रोफजीन २५% ए सी १.५ एमएल वा फिप्रोनिल ५% १.५ एमएल प्रतिलिट पानीमा वा इमिडाल्करोपीड १ एम एल ४ लिटर पानीमा मिसाइ फेदमा पनि पर्ने गरि छर्ने ।

(५) धानको पहेलो गवारो (Yellow rice borer)

पहिचान: वयस्क पुतली: पोथीका चम्किला पहेला-खखैरा अधिल्ला पखेटाहरु प्रत्येकमा स्पष्ट देखिने कालो थोप्ला । पेटका पुछारमा पहेला रौहरुको गुच्छा । भाले पुतलीका फिक्का खैरा अधिल्ला पखेटाहरुको चुच्चो परेको ठाँउमा खैरा मसिना थोप्लाहरु । फिजिएका पखेटाहरुका नाप: ३२ मि.मि. र शरीरको लम्बाइ: १३ मि.मि. । लाभ्रे पहेलो, सफा शरीर २० मि.मि. लामो ।



लाभ्रा



वयस्क



क्षतिको लक्षण: गुवो मरेको बोट । सेतो धानको बाला ।

रोकथामका उपाय: धान रोपिसकेर १० देखि ४० दिनपछि बालीको निरीक्षण गर्ने । जमिनको सतह छुने गरी धान काट्ने । बीटी ३ ग्राम प्रति लि. छर्ने । बेर्नाको टुप्पो चुडाई रोप्ने । अण्डा परजिवी ट्राइकोग्रामा ५०००-१००० प्रति हे. छोड्ने । रोपिएको ४१ देखि ८० दिनपछि गुवाहरु मर्ने क्रम ५% नाघेमा र यस दौरान वितेका २ साताहरु बीच कीटनाशक विषादिको प्रयोग नभएको भए विषादिको उपचार गर्ने । १०% भन्दा बढी गुवाहरु मरेका छन् भने ०.०५ % फेनिट्रोथायन, ०.०४% को डिमेबोयएट वा प्रति है. १५ किलो कार्बोफुरान खास विषले धानका बोटहरुको उपचार गर्ने । कार्बोफुरान

"कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा र पूर्वाधार : सभ्य समृद्ध वराहपोखरी गाउँपालिकाको मूल आधार"



www.barahapokharimun.gov.np info@barahapokharimun.gov.np ANB No. 1618070703601





बराहपोखरी गाउँपालिका

BARAHAPOKHARI RURAL MUNICIPALITY

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ

BAGHKHOR BHANJYANG, KHOTANG

कोशी प्रदेश, नेपाल

KOSHI PROVINCE, NEPAL




प.सं.: २०८२।८३

च.नं.:

३ % सीजि वा काटापहाइक्लोराइड ४% गोडा विषदिको प्रयोग २५ केजी/हे. दरले प्रयोग हुदाँ खेतमा ५-८ से मी. पानी हुन् पर्छ र यो पानी ५ दिनसम्म कायम यम हुनु पर्छ ।

(६) धानको गुलाबी गवारो (Pink borer)

पहिचान: वयस्क: पुतली : फिक्का पहेँला खैरा अघिल्ला पखेटाहरु धर्साहरु फैलिएर पखेटाको टुप्पा सम्म पुगेका । बलिष्ट बनोट । सेता पछिल्ला पखेटाहरु । फिजिएका पखेटाहरुको नाप : ३३ मि.मि. । लाभ्रे सुन्तले सिर गुलाबी माथिल्लो शरीरको सतह र ३५ मि.मि. लामो ।



स्वाभरी



वयस्क

क्षतिको लक्षण: मरेका गुवाहरु । सेता धानका बालाहरु ।

रोकथामका उपाय: धानका पहेँला गवारोहरु जस्तै ।

७. धानको ढुङ्गे कीरा (Rice Gallmidge)

पहिचान: वयस्क : मिज भिंगा ३-४ मि.मि. लामो, सानो लाम्खुटे माफिकको कीरा । मधुरो खैरो शरीर । पोथीको चम्किलो रातो पेट । लाग्ने औसा समानको कैलो सेतो लाभ्रे । छिपिएको लाभ्रे ३ मि.मि. लामो, सिर तर्फ चुच्चिएको र रातो शरीर ।



स्वाभरी



वयस्क





बराहपोखरी गाउँपालिका
BARAHAPOKHARI RURAL MUNICIPALITY
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ

BAGHKHOR BHANJYANG, KHOTANG

कोशी प्रदेश, नेपाल

KOSHI PROVINCE, NEPAL



प.सं.: २०८२।८३


च. नं.:

क्षतिको लक्षण: विकसित हुँदो बोटमा गाँजाको ठाउँमा प्याज पातो विकृत रुप देखिनु । सेतो नली (silver shoot) / प्याजको नली (onion shoot) को रुप देखिने ।

रोकथामका उपाय: धानको बोटहरुसँग रहेका झारपातहरु र जंगली धानका बोटहरु निकाल्ने । धान काटिसके पछि जमिन जोत्ने । मुत्सुङ्गि शुरु भइसकेपछि प्रकाशावधि संवेदनशील र प्रकाशावधि असंवेदनशील धानका जातहरुलाई क्रमशः ढीलो र छिटो रोप्ने । सकभर धान रोपाई प्रत्येक इलाकामा एकै पटक गर्ने । चाहिदो मात्राको नाइट्रोजन मल एकै पटक नराखी विभाजित मात्रामा पटक पटक गरी प्रयोग गर्ने । उपलब्ध भए दुइग्रे कीरा अवरोधक जातको धान रोप्ने । मसुली धानमा मध्यम स्तरको कीरा अवरोधक गुण छ । धानको खेतमा प्रति हे. कार्बोफुरान खास विष ०.५४।०.५% को फेनिट्रोथायन, वा डिमोथोएटले बोटको उपचार गर्ने । कार्बोसल्फान २५% इस १ मि.लि/लि पानीको दरले स्प्रे गर्ने ।

द. धानको सेतो पिठ्युँ फड्के (Rice White back plant hopper)

पहिचान: वयस्क : कालो शरीरको माथिल्लो सतह । पखेटाहरुको अधार भएको ठाँउमा सेता पाता । साना र ठूला पखेटाहरु हुने दुवै थरिका । ३.५-४ मि.मि. लामो शरीर साँगुरिएको अनुहार । पारदर्शक पखेटाहरुमा काला नसाहरु । अघिल्लो भागमा कालो पाता । शिशु फड्के : फिक्का खैरा ।



क्षतिको लक्षण: पातको तल्ला सतह पहेँलो । पातहरुमा काला दुसीहरु । कम गौजहरुको संख्या । अविकसित बोटहरु ।

रोकथामका उपाय: धानको खैरो फड्के नियन्त्रण गरे झैं ।

"कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा र पूर्वाधार : सभ्य समृद्ध बराहपोखरी गाउँपालिकाको मूल आधार"



www.barahapokharimun.gov.np info@barahapokharimun.gov.np ANB No. 1618070703601





बराहपोखरी गाउँपालिका
BARAHAPOKHARI RURAL MUNICIPALITY
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
OFFICE OF THE RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ
BAGHKHOR BHANJYANG, KHOTANG
कोशी प्रदेश, नेपाल
KOSHI PROVINCE, NEPAL




प.सं.: २०८२।८३

च.नं.:

९. घानको पतेरो (Rice Gundhi Bug)

पहिचान: वयस्क : हरियो खैरो, सुलुत्त परको शरीर १७.५ मि.मि. लामो । पिठ्युँमा काला धर्साहरु ।
एण्टिनाको आधार खण्ड गाढा खैरो रंगको । शिशु पतेरो : हरियो खैरो



क्षतिका लक्षण: स्याप्प परेका धानहरु । बाला सेतो हुनु । धानमा स्वभाविक रंग नहुनु । चामलमा
पहेँलो परेको भाग धानको खोस्टामा अवस्थित लेमा र पालिया बीच कीराको स्टाइलेट सीथ ।

रोकथामका उपाय: खेत र वरिपरिका ठाँउहरुमा घाँसे झारपात उम्रन नदिनु । प्रत्येक इलाकामा एकै
पटक धान रोप्ने । छिटो र अबेला पाक्ने दुवै जातको धजको अघाँटे रोपाई । बालामा दुध पसाउने
बेलामा ०.०५% को मालायायन, फेनिट्रोथायन, ०.१% को कार्बराइल, फेनमलरेट ०.०३% वा सुर्तीको
झोल-पानीले बोटमा विशेष गरेर धानका बालाहरुमा उपचार गर्ने । डर्टीट्रापको प्रयोग गर्ने ।

(नोट: अन्य कृषि सम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित वडा कृषि प्राविधिक वा कृषि विकास
शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।)

